

REGISTRO SAGARPA Q-5918-094
USO VETERINARIO
SOLUCIÓN INYECTABLE
ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO Y ANTIINFLAMATORIO
NO ESTEROIDAL



FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Flunixin de meglumina 83.0 mg.

(Equivalente a 50.0 mg de Flunixin base)

Vehículo c.b.p. 1.0 mL

USO EN:

Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caprinos, Caninos y Felinos.

INDICACIONES:

Megluvet está indicado como antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esteroide, asociado a padecimientos respiratorios, septicemias, mastitis, metritis, cólico, alteraciones del músculo esquelético que pueden presentarse en bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, caninos y felinos.

DOSIS:

Bovinos de engorda y lecheros: 1 a 2 mL por cada 45 kg de peso corporal (equivalente de 1.1 a 2.2 mg de flunixin base por cada kg) cada 24 horas no más de 5 días.

Ovinos, Caprinos y Porcinos: 2 mL por cada 45 kg de peso (equivalente a 2.2 mg de flunixin base por cada kg de peso) cada 24 horas.

Equinos: 1 a 2 mL por cada 45 kg de peso corporal (equivalente de 1.1 a 2.2 mg de flunixin base por cada kg) cada 24 horas durante no más de 4 días.

Caninos y felinos: 1 mL por cada 45 kg de peso corporal (equivalente a 1.1 mg/kg de p.v.).

La modificación en la dosis queda a criterio del médico veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o intravenosa.

ADVERTENCIAS:

No consumir la leche de animales tratados hasta 12 horas después de su última aplicación.

No consumir carne de animales tratados hasta 24 horas después de su último tratamiento.

En cerdos no usar 21 días antes del sacrificio.

Evite la aplicación intraarterial.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

No se exponga a la luz.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Producto para uso exclusivo en medicina veterinaria

PRESENTACIÓN:

Frasco con: 20 ml., 100 ml. y 250 ml.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Hecho en México por:
QUIMICA FARVET S.A. DE C.V.
Matamoros No 150-A
Col. Centro, C.P. 59300
La Piedad, Michoacán
Tels: (352)526-4440 y (352)526-1502