

Clostrisan®

10+HS

Núm. de Registro: B-10575-021

Bacterina-toxoide clostridial.

USO EN:



FÓRMULA:

Cada mL contiene mínimo:

<i>Clostridium chauvoei</i>	1X10 ⁹ UFC
<i>Clostridium septicum</i>	1X10 ⁹ UFC
<i>Clostridium sordelli</i>	1X10 ⁹ UFC
<i>Clostridium novyi</i>	1X10 ⁹ UFC
<i>Clostridium perfringens</i> tipo C.....	1.5X10 ⁸ UFC
<i>Clostridium perfringens</i> tipo D.....	1.5X10 ⁸ UFC
<i>Pasteurella multocida</i> tipo A4X10 ⁷ UFC
<i>Pasteurella multocida</i> tipo D	4X10 ⁷ UFC
<i>Mannheimia haemolytica</i> serotipo A1...	3X10 ⁸ UFC
<i>Haemophilus somnus</i>	3X10 ⁹ UFC
Adsorbidas en hidróxido de aluminio.....	0.25%

*Contenido antes de la inactivación



INDICACIONES:

Para la prevención del Carbón Sintomático, Edema Maligno, Hepatitis Necrótica Infecciosa, Enterotoxemias, Miositis, Pasteurelosis, Infecciones por *Mannheimia haemolytica* y *Haemophilus somnus* en bovinos, ovinos y caprinos.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS :

Subcutánea o intramuscular.

Bovinos: 5 mL. **Ovinos y caprinos:** 2.5 mL.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Agite antes de usar. La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas, en caso de presentarse aplicar epinefrina. Aplicar únicamente en animales sanos. No se deje al alcance de los niños. Conserve en refrigeración entre 2° y 4°C. Evite la congelación y la exposición a la luz solar directa.

PERIODO DE RETIRO:

No usar este producto 21 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.



PRESENTACIONES:

Frascos con 50 mL/ 10 dosis
y 250 mL/ 50 dosis



USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
© Marca Registrada

sanfer®
SALUD ANIMAL