

Diarrefin®

Núm. de Registro: Q-10575-013

Antidiarreico. Suspensión oral.

USO EN:



FÓRMULA:

Cada mL contiene:
Sulfato de Colistina.....250,000 UI
Caolin150 mg
Pectina.....8 mg
Metilbromuro de Homatropina.....0.25 mg
Vehículo c.b.p.....1 mL



INDICACIONES:

Para el tratamiento de infecciones gastrointestinales causadas por microorganismos gram negativos en bovinos de engorda y productores de leche, porcinos, ovinos, caprinos y caninos.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Oral.

1 mL por cada 5 kg de peso vivo por vía oral, cada 12 horas durante 3 a 5 días.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Agítase antes de usarse. Conserve el frasco a temperatura ambiente a no más de 30°C en un lugar seco.

No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos.

PERIODO DE RETIRO

Carne y Leche: 5 días.



PRESENTACIONES:

Frascos con 60, 120 y 240 mL.

Frasco 1 L.

Garrafa 4 L.



USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
© Marca Registrada

sanfer®
SALUD ANIMAL