

# Imidocarb sanfer®

Núm. de Registro: Q-10575-023

Antihematozoario.  
Solución inyectable

## USO EN:



## FÓRMULA:

Cada mL contiene:  
Dipropionato de Imidocarb.....120 mg  
Vehículo c.b.p. ....1 mL



## INDICACIONES:

Para el tratamiento y control de piroplasmosis en bovinos de carne y leche, equinos y caninos. En bovinos, *Babesia bovis*, *Babesia bigemina*, en equinos, *Babesia caballi*, *Babesia equi*, en caninos, *Babesia canis*. Tratamiento y control de anaplasmosis en bovinos causada por *Anaplasma marginale*.



## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS :

**Bovinos y caninos:** Subcutánea o intramuscular.  
**Equinos:** Intramuscular.

**Bovinos:** Piroplasmosis dosis única de 1 mL/100 kg de peso vivo. Anaplasmosis una dosis de 2.5 mL/100 kg de peso vivo, puede requerir una segunda dosis.

**Equinos:** Una dosis de 2 mL/100 kg de peso vivo, si es necesario aplicar una segunda dosis 2 días después.

**Caninos:** Dosis única de 0.25 mL/10 kg de peso vivo.

La frecuencia y duración del tratamiento son a criterio del Médico Veterinario.



## INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

No aplicar simultáneamente con antihelmínticos o en animales que estén en contacto con pulgicidas. En caso de presentar efectos colaterales (salivación, cólico) aplicar atropina. Conserve en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar, a temperatura inferior a 25°C. No usar en equinos para consumo humano. No se deje al alcance de los niños.

**UNA VEZ CONSUMIDO EL PRODUCTO, INCINERE EL FRASCO Y SOBRES.**

**PERIODO DE RETIRO:**  
Carne: 90 días Leche: 5 días



## PRESENTACIONES:

Frasco con 100 mL.  
Caja con 6 frascos de 30 mL c/u.



USO VETERINARIO  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA  
© Marca Registrada

**sanfer®**  
SALUD ANIMAL