

SERIGAN ESPONJAS VAGINALES

FICHA TÉCNICA

Reg. SAGARPA.: Q-0029-038

Esponja Intravaginal con

Fórmula:	Cada esponja contiene: Medroxiprogesterona acetato.....65 mg Excipiente c.b.p.....1 esponja (Poliuretano)
Indicaciones:	Sincronización del estro e inducción de la actividad cíclica en época de anestro de las ovejas sexualmente maduras. Se recomienda su aplicación en conjunto con la Gonadotropina Sérica de Yegua gestante (PMSG). Si se aplica la esponja a ovejas primíparas, estas deben contar con 7 meses de edad o pesar el 70% de su futuro peso como adultas.
Dosis:	Una esponja Intravaginal y dejarla 12 a 14 días. Durante la época de anestro, las esponjas deben retirarse a los 12 o 14 días y administrar simultáneamente 400 a 600 UI de PMSG antes de retirada la esponja o 6 horas después de haberla retirado para evitar una disminución en la ovulación.
Vía de Administración	Intravaginal. La esponja debe colocarse con la ayuda de un aplicador y este deberá desinfectarse antes de su uso (no emplear alcoholes, cresoles, o fenoles). Cuando la aplicación de las esponjas en las corderas se dificulte, no se debe forzar la introducción del aplicador, si no realizar un masaje o una ruptura manual del himen si fuera necesario.
Advertencias:	+ Para evitar irritación vaginal no deje la esponja por un periodo largo de tiempo. + No se recomienda su colocación en hembras enfermas que presenten flujos vaginales anormales o que acaben de abortar. + No colocar las esponjas en hembras gestantes. + los operarios deben portar guantes durante la manipulación del producto.
Tiempo de retiro	No requiere.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA CUANTIFICADA

PARA USO EXCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO