

Bovisec®

Núm. de Registro: Q-10575-039

**Combinación antibiótica.
Infusión intramamaria.**

USO EN:



FÓRMULA:

Cada 10 mL contienen:
Penicilina G procaína 1 000 000 U.I.
Neomicina base
(como sulfato de neomicina) 250 mg
Vehículo c.b.p 10 mL

INDICACIONES:

Bovisec® está indicado para la prevención de mastitis durante el período seco en bovinos, ovinos y caprinos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Intramamaria.

Especie	Cantidad	Frecuencia
Bovinos	1 Jeringa por cada cuarto	Después del último ordeño
Ovinos y Caprinos	1 Jeringa por cada medio	Después del último ordeño

Aplicar el contenido completo de una jeringa en cada uno de los cuartos (bovinos) o medios (ovinos y caprinos) después del último ordeño. Una sola aplicación suele ser suficiente, sin embargo, animales con altas producciones de leche tienen un aumento de presión en la ubre al momento del secado, lo que provoca que el canal del pezón permanezca abierto y haya pérdida del producto; en estos casos se recomienda ordeñar al detectar el goteo y el uso de una segunda aplicación de Bovisec.

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

TIEMPO DE RETIRO:

No destinar la leche para el consumo humano hasta 4 días después del parto. No destinar para el consumo humano la carne de animales tratados hasta 30 días después de la aplicación del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar fresco y seco a no más de 30 °C. Protéjase de la luz solar directa. Deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente aplicable en su región.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Se han descrito relativamente pocos eventos adversos secundarios a la aplicación de Bovisec. La administración de penicilinas puede causar reacciones de hipersensibilidad que se manifiestan con prurito y erupciones cutáneas.

PRESENTACIÓN:

Cubeta con 30 jeringas con 10 mL c/u.

sanfer®
SALUD ANIMAL