

Mastilac®

Núm. de Registro: Q-10575-038

**Combinación antibiótica más desinflamatorio.
Infusión intramamaria.**

USO EN:



FÓRMULA:

Cada 10 mL contienen:
Gentamicina base
(como sulfato de gentamicina) 180 mg
Neomicina base
(como sulfato de neomicina) 300 mg
Flumetasona 0.25 mg
Vehículo c.b.p. 10 mL

INDICACIONES:

Mastilac® está indicado para el tratamiento de mastitis en bovinos, ovinos y caprinos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Intramamaria.

Bovinos: 1 jeringa por cada cuarto afectado.

Ovinos y caprinos: 1/2 jeringa por cada medio afectado.

Aplicar cada 12 horas después del ordeño por 3 días.

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

TIEMPO DE RETIRO:

No deberá utilizarse la leche procedente de animales tratados con este producto hasta 5 días posteriores a la última aplicación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar fresco y seco. Guardar a temperatura ambiente entre 10 °C y 30 °C. Protéjase de la luz solar directa. Una vez utilizado deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente aplicable en su región.

PRESENTACIÓN:

Cubeta con 30 jeringas con 10 mL c/u.

sanfer®
SALUD ANIMAL